



CARTAS AL DIRECTOR

Bloqueo auriculoventricular completo secundario a radioterapia: papel de las vías accesorias

Complete atrioventricular block secondary to radiotherapy: Role of the accessory pathways

Sr. Director:

En una interesante carta científica Garcipérez de Vargas et al. describen un caso de un paciente joven que sufre un bloqueo auriculoventricular (AV) completo que precisa del implante de un marcapasos transitorio de forma urgente¹. Coincidimos con los autores en que la radioterapia (RT) hace años no permitía una apropiada preservación de los órganos críticos, por lo que la hipótesis de que esta terapia pudiera predisponer a un trastorno de conducción grave como el que describen es plausible.

Queremos, sin embargo, llamar la atención sobre el antecedente de ablación de una vía accesoria AV 4 años antes. Es ampliamente conocido el desarrollo de fenómenos de bloqueo AV completo tras la ablación con catéter en puntos cercanos al sistema específico de conducción, incluyendo la ablación de vías accesorias². Aunque no tratamos de explicar el bloqueo AV por la ablación de la vía accesoria, puesto que esta complicación únicamente está descrita como bloqueo diferido 24 h después de la ablación³, sí consideramos que debería haberse enumerado entre las diferentes etiologías de bloqueo AV. Desconocemos si en dicha fecha se realizó un estudio electrofisiológico (EEF) completo que pudiera haber revelado alguna afectación de la conducción eléctrica a nivel intra o infrahisiano como efecto secundario a la RT. Aunque la utilidad del EEF completo antes de abordar la ablación en el síndrome de Wolf-Parkinson-White ha llegado a ser cuestionada⁴, en este paciente podría haber sido de gran ayuda. De hecho, si se hubiese detectado afectación en el sistema específico de conducción a nivel intra o infrahisiano la ablación probablemente debería haberse evitado, ya que la propia vía accesoria puede ser un mecanismo alternativo de conducción AV en casos de blo-

queo AV avanzado⁵. Esto podría haber evitado la posterior necesidad de implantar un marcapasos a una edad tan temprana.

En definitiva, creemos necesario destacar la ablación con catéter como una de las potenciales causas de bloqueo AV completo, hecho conocido desde hace más de dos décadas². Consideramos además que la realización de un EEF previo en un paciente donde probablemente el sistema de conducción se encontrase alterado en cierto grado podría haber cambiado la actitud terapéutica y su evolución posterior.

Bibliografía

1. Garcipérez de Vargas FJ, Gómez-Barrado JJ, Sánchez-Calderón P, Lezcano-Gort LE, Ortiz C, Mendoza J. Complete atrioventricular block secondary to radiotherapy. *Med Intensiva*. 2013;37:211–2.
2. Hindricks G. The Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS): Complications of radiofrequency catheter ablation of arrhythmias. The Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS) investigators of the Working Group on Arrhythmias of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J*. 1993;14:1644–53.
3. Liu J, Dole LR. Late complete atrioventricular block complicating radiofrequency catheter ablation of a left posteroseptal accessory pathway. *Pacing Clin Electrophysiol*. 1998;21:2136–8.
4. Rosenbaum M, Klein GJ, Krahn A, Basta M, Le Feuvre C, Yee R. Utility of full electrophysiological study before accessory pathway ablation in Wolff-Parkinson-White syndrome. *Can J Cardiol*. 1997;13:359–62.
5. Palanca V, Quesada A, Roda J, Villalba S, Mihi N, Velasco J. Intermittent atrioventricular block in an accessory pathway associated with complete infrahissian block. *Rev Esp Cardiol*. 2004;57:363–6.

F. Gomez-Pulido^a, A. Illescas-Vacas^b,
J.J. Egea-Guerrero^{c,d,*} y R. Martín-Bermúdez^c

^a Unidad de Arritmias, Unidad de Gestión Clínica del Corazón, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

^b Oncología Radioterápica, Unidad de Gestión Clínica de Oncología Integral, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

^c Unidad de Cuidados Intensivos. Unidad de Gestión Clínica Cuidados Críticos y Urgencias, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

^d Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla/CSIC. Universidad de Sevilla, Sevilla, España

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: juanjoegea@hotmail.com, juanj.egea.sspa@juntadeandalucia.es (J.J. Egea-Guerrero).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.medint.2013.05.001>

Respuesta a «Bloqueo completo auriculoventricular secundario a radioterapia: papel de las vías accesoria»

Response to «Complete atrioventricular block secondary to radiotherapy: Role of accessory pathways»

Sr. Director:

Agradecemos el interés en nuestra carta¹ que los firmantes del comentario han mostrado, y a usted mismo y al Comité Editorial de MEDICINA INTENSIVA la oportunidad de responder a él.

Por una parte, estamos de acuerdo en que los procedimientos de ablación son causa de bloqueo auriculoventricular (AV) yatrógeno², siendo sin embargo, una complicación poco frecuente. En el último Registro Español de ablación con catéter del año 2011 publicado por la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, de un total de 1.813 procedimientos de ablación de vías accesoria se produjo bloqueo AV con necesidad de marcapasos definitivo en 4 casos³. En nuestro paciente como ya argumentamos existen una serie de datos que apoyan la relación entre el bloqueo AV y la radioterapia, y no consideramos la ablación entre las posibles causas del bloqueo AV, dado que ocurrió 4 años después de la ablación y, además, en este caso se trataba de una vía posterolateral izquierda que está alejada del sistema de conducción normal como para considerar esta posibilidad. Esta complicación se ha descrito fundamentalmente cuando la localización de la vía accesoria es perihisiana o medioseptal, habiéndose propuesto la utilización de criablación en vez de radiofrecuencia para minimizar el riesgo⁴.

Por otra parte, en nuestro paciente no se realizó un estudio electrofisiológico (EEF) exhaustivo, sino que directamente se procedió a la ablación de la vía accesoria. No creemos que la realización de un estudio electrofisiológico exhaustivo en este caso hubiese cambiado la actitud terapéutica y evolución posterior, ya que nuestro paciente estaba muy sintomático por episodios de palpitaciones secundarios a taquicardia ortodrómica mediada por vía accesoria, lo cual se considera una indicación clase I para ablación⁵ según las guías europeas y americanas, y no había otra alternativa. Nuestro paciente no había presen-

tado ningún episodio sincopal previo que hiciese sospechar de un trastorno de conducción en el momento de realizarse la ablación y, además, en caso de vías accesoria con buena capacidad de conducción, es posible que no se manifieste el bloqueo durante el EEF, sino solo después de la ablación de la vía accesoria. Además, presuponer que la vía accesoria sería suficiente para suplir la demanda crontrópica de un varón joven requeriría una conducción anterógrada por la vía que fuese excepcional, lo que incrementa el riesgo de fibrilación auricular preexcitada y muerte súbita.

Bibliografía

1. Garcipérez de Vargas FJ, Gómez-Barrado JJ, Sánchez-Calderón P, Lezcano-Gort LE, Ortiz C, Mendoza J. Complete atrioventricular block secondary to radiotherapy. Med Intensiva. 2013;37:211-2.
2. Hindricks G. The Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS): Complications of radiofrequency catheter ablation of arrhythmias. The Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS) investigators of the Working Group on Arrhythmias of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 1993;14:1644-53.
3. Díaz-Infante E, Macías Gallego A, Ferrero de Loma-Osorio Á. Registro Español de Ablación con Catéter. XI Informe Oficial de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (2011). Rev Esp Cardiol. 2012;65:928-36.
4. Gaita F, Haissaguerre M, Giustetto C, Grossi S, Caruzzo E, Bianchi F, et al. Safety and efficacy of cryoablation of accessory pathways adjacent to the normal conduction system. J Cardiovasc Electrophysiol. 2003;14:825-9.
5. Blomström-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, Alpert JS, Calkins H, Camm AJ, et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias—executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the European Society of Cardiology committee for practice guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias) developed in collaboration with NASPE-Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2003;42:1493-531.

F.J. Garcipérez de Vargas*, R. Porro, J.J. Gómez-Barrado y G. Marcos

Servicio de Cardiología, Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: fj.garci@hotmail.com (F.J. Garcipérez de Vargas).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.medint.2013.07.010>