



IMÁGENES EN MEDICINA INTENSIVA

Canalización supraclavicular ecoguiada de vena cefálica, una alternativa a los accesos centrales clásicos



Ultrasound-guided supraclavicular catheterization of the cephalic vein: An alternative to classical central accesses

Alejandro Gómez-Carranza^{a,*}, Francisco Javier Vasserot-Vargas^a y Beatriz Girela-Pérez^b

^a Hospital Universitario Poniente, El Ejido, Almería, España

^b Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería, España

Disponible en Internet el 3 de enero de 2025




Figura 1

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: goca.alejandro@gmail.com
(A. Gómez-Carranza).

Varón de 33 años que ingresa en la UCI por distrés respiratorio secundario a neumonía por *Legionella*, precisando bloqueo neuromuscular y decúbito prono al ingreso. Previo a esto, se realiza una canalización ecoguiada de la vena cefálica derecha, en su porción final, donde drena a la vena subclavia. En la [figura 1](#) y en el [vídeo 1](#) se muestra un corte longitudinal de la guía de canalización en su paso por la unión de las venas cefálica y axilar, convirtiéndose en subclavia derecha. En la radiografía de tórax se comprueba su normoposicionamiento ([fig. 1](#)). Esta canalización permite una alternativa ecoguiada a la subclavia infraclavicular, no siempre abordable por ecografía y con mayor riesgo de neumotórax, no asumible en pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Por otro lado, presenta un posicionamiento más accesible durante el decúbito prono en comparación a otros accesos venosos ([imágenes suplementarias](#)).

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en <https://doi.org/10.1016/j.j.medin.2024.502118>.